

Số: /UBND-KN
V/v: Tăng cường phòng trừ rầy
nâu, rầy lưng trắng hại lúa vụ
xuân năm 2024

Linh Thông, ngày tháng 05 năm 2024

Kính gửi: Các ông trưởng xóm trên địa bàn xã!

Hiện nay lúa xuân đang giai đoạn ôm đòng - trở bông. Thời tiết hiện nay mưa nắng xen kẽ rất thuận lợi cho rầy nâu, rầy lưng trắng phát triển gây hại. Qua kiểm tra đồng ruộng tại các xóm Nà Chát, Bản Chang, Linh Sơn, Tân Vàng: Rầy các loại mật độ trung bình 450 – 600 con/ m², nơi cao 1200 – 1500 con/ m², có những ruộng đã bị rầy gây cháy chòm cục bộ. Dự báo trong những ngày tới rầy non tiếp tục nở, mật độ rầy tăng nhanh trên phạm vi diện rộng gây hại cho cây lúa. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra UBND xã hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ như sau:

1. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm kịp thời đối tượng rầy.
- Vệ sinh đồng ruộng, dọn tàn dư cây cỏ và rác.

- Lúa giai đoạn ôm đòng – trở bông: Giữ nước thường xuyên trên ruộng. Đối với những ruộng có mật độ cao từ 40 con/khóm trở lên, những ruộng chủ động nước nên sử dụng các loại thuốc có tính nội hấp, lưu dẫn như: Actara 25WG, Chessin 600WP, ChetDuc 700WG, Mopride 20WP, Calira 555WP... Sau phun 3-5 ngày kiểm tra lại, nếu rầy tiếp tục nở, mật độ còn cao cần phun lại lần 2, dùng luân phiên các loại thuốc để tránh rầy kháng thuốc.

- Đối với diện tích lúa từ giai đoạn trở đi, những ruộng khô hạn sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc, xông hơi như: Daran – HB 250WP, Bassa 50EC, Bisector 500EC, Sieuray 250WP, Vibasa 50EC... (Yêu cầu phải rẽ lúa thành luống, mỗi luống rộng từ 0,5 - 0,6m và phun trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy tập trung gây hại).

** Một số chú ý khi phun trừ rầy:*

- Rầy nâu là loại côn trùng có tính chống thuốc cao, nên sử dụng khi rầy tuổi nhỏ (rầy cám tuổi 1-2). Khi sử dụng nhiều lần một loại thuốc hoặc mật độ rầy cao, tỷ lệ rầy trưởng thành lớn cần phối hợp 2 loại nhóm thuốc khác nhau trừ rầy mới có hiệu quả.

- Khi phát hiện rầy trên đồng ruộng thì phải phun thuốc đặc trị rầy. Khi phun thuốc phải tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng”: Đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách. Khi lúa trở phải phun thuốc vào buổi chiều mát. Những ruộng mật

độ rầy cao, thường hay gây hại nặng cần giữ nước trong ruộng đến lúc gần thu hoạch hoặc mật độ rầy đã giảm mới tháo cạn nước để chuẩn bị thu hoạch.

2. Các loại sâu bệnh hại khác

Tiếp tục theo dõi và thực hiện phòng trừ các loại sâu bệnh khác như: Sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn...

Ngoài ra cần lưu ý hiện tượng lúa bị vàng lá, đặc biệt trên trà lúa xuân muộn giai đoạn đứng cái-làm đòng, ruộng bón thiếu dinh dưỡng, ruộng khô hạn thiếu nước. Nguyên nhân do điều kiện thời tiết thay đổi bất thường từ nhiệt độ cao, đột ngột nhiệt độ giảm thấp, để thích nghi với điều kiện thời tiết bất thường cây lúa sẽ bị vàng lá. Đối với hiện tượng vàng lá do yếu tố thời tiết gây ra, không phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ bệnh vàng lá lúa. Áp dụng các biện pháp chăm sóc cho cây lúa phục hồi như: những ruộng thiếu dinh dưỡng cần bổ sung phân cho cây (bón thêm phân chuồng hoai mục, phân kaly, phun phân bón qua lá...) và bổ sung thêm nước trên chân ruộng cạn.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ông trưởng xóm thông báo rộng rãi văn bản này đến các hộ dân trong xóm. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vp

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ma Thế Anh